НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

ОТДЕЛ „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

Анализ на изпълнението на дейностите по имунопрофилактика в България през 2025 година

Н. Владимирова, А. Минкова, Л. Маринова

Годишният анализ на дейностите по имунопрофилактика в България през 2025 г. представя изпълнението на:

- задължителните имунизации, включени в имунизационния календар на страната за 2025 г. и за периода 2020-2025 г. (имунизационен обхват);
- целевите имунизации през 2025 г.;
- препоръчителните имунизации срещу вирусни хепатити А и Б, жълта треска, човешки папиломен вирус, ротавирусни инфекции, сезонен грип и др. (2025 г.);
- изпълнението на националните програми за профилактика и контрол на ротавирусни гастроентерити, на рак на маточната шийка, на грип и пневмококова инфекция при лица на/над 65-годишна възраст, посредством прилагане на ваксини, осигурени от Министерство на здравеопазването.

За целите на анализа са използвани обобщенията на извършените имунизации и изчисленията за имунизираните лица, предоставени на НЦЗПБ от Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), по реда на чл. 28 и чл. 29 на Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България.

През 2025 г. са направени изменения и допълнения в наредбата, публикувани в ДВ, брой 67/15.08.2025 г., отнасящи се до реда и начина на определяне на целевите имунизации и реимунизации, въвеждането на нови целеви имунизации – срещу коклюш и RSV-инфекция при бременни, разширяването на препоръките за някои от препоръчителните имунизации (напр. срещу менингококова инфекция при деца и младежи), определяне и закупуване на биопродуктите, както и заявяването, разпределението, отпускането, отчитането им (нови кодове в Приложение 7) и планирането им (Приложение 8) чрез електронна система, създадена и поддържана от Министерство на здравеопазването. Измененията и допълненията в наредбата се отнасят и до регламентирането на достъпа до и работата със системата (чл. 6б, 7, 12, 13).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2025 г.

Данните за имунизационния обхват със задължителните ваксини в детска възраст през периода 2020-2025 г. са представени в **Таблица 1.**

Таблица 1. Брой имунизирани и имунизационен обхват (%) на децата със завършена първична имунизация през 2020-2025 в България.

Имунизация срещу	**Брой имунизирани и имунизационен обхват (%) в периода 2020-2025 г.**					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Туберкулоза (новородени)	51 588 (97,0)	48 868 (97,7)	51 549 (96,5)	46 727 (96,5)	49 692 (96,7)	47 610 (94,5)
Вирусен хепатит тип Б	50 632 (91,5)	48 144 (89,4)	48 753 (91,5)	48 644 (92,3)	50 322 (94,2)	44 956 (89,3)
Дифтерия, тетанус, коклюш	50 600 (91,2)	48 345 (89,5)	48 473 (91,4)	49 218 (92,4)	51 387 (94,2)	46 166 (91,7)
Полиомиелит	50 600 (91,2)	48 345 (89,5)	49 993 (91,4)	49 218 (92,4)	51 387 (94,2)	46 166 (91,7)
Хемофилус инфлуенце тип *б*	50 325 (91,4)	48 182 (89,5)	48 473 (91,6)	49 218 (92,4)	51 084 (94,2)	45 354 (90,1)
Пневмококови инфекции	28 887 (90,3)	55 726 (89,3)	55 774 (91,2)	45 644 (87,4)	47 081 (91,0)	46 094 (85,5)
МПР (на 13 месеца)	49 418 (88,3)	48 351 (88,7)	50 381 (91,2)	51 385 (91,6)	52 089 (94,2)	47 584 (88,3)
МПР (на 12 години)	54 257 (84,5)	55 999 (85,8)	57629 (87,2)	54 162 (87,4)	57 264 (90,5)	49 939 (82,1)

Имунизация срещу туберкулоза

Имунизационният обхват на новородените с БЦЖ ваксина е представен в **Таблица 2**, сравнително за периода 2020-2025 г. Традиционно, имунизационният обхват срещу туберкулоза при новородените деца е висок. През 2025 г. са ваксинирани 47 610 новородени деца (имунизационен обхват 94,55%).

Таблица 2. Брой имунизирани новородени и имунизационен обхват (%) срещу туберкулоза в България, 2020-2025 г.

Имунизация срещу туберкулоза (новородени)	**Брой имунизирани и имунизационен обхват (%), 2020-2025 г.**					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	53 178	48 868	51549	46 727	49 692	47 610
	(97,0)	(97,7)	(96,5)	(96,5)	(96,7)	(94,5)

Изпълнението на имунизацията срещу туберкулоза на новородените, както и реимунизацията на децата на 7-годишна възраст, които са проверени с туберкулинов кожен тест и са с отрицателен резултат от изследването на туберкулиновата чувствителност, са представени подробно в **Таблица 3.**

Таблица 3. Обхват на подлежащите на проба Манту и БЦЖ ваксинация през 2025 година.

Показател	Възраст		
	Новородени	7 мес.	7 год.
Подлежащи на имунизация с БЦЖ ваксина	50 356		
Имунизирани с БЦЖ ваксина	47 610		
Проверени с тест Манту		5 217	47 836
Имунизирани (от проверените с тест Манту)		3 405 (65,26%)	19 211 (40,16%)

Имунизация срещу дифтерия, тетанус и коклюш

Задължителна имунизация (три приема ваксина) срещу дифтерия, тетанус и коклюш при деца до 1-годишна възраст

Имунизационният обхват с трети прием ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (сумарно шествалентна, петвалентна и четиривалентна) е 91,68% **(Таблица 4)**.

Таблица 4. Имунизация срещу дифтерия, тетанус и коклюш през 2025 г.

Ваксина	Комбинирани ваксини срещу дифтерия, тетанус и коклюш		
Приеми	Подлежащи деца до 1 година	Имунизирани	%
1 прием	50 356	48 777	96,86
2 прием	50 356	46 531	92,40
3 прием	50 356	46 166	91,68

Задължителна реимунизация (четвърти прием ваксина) срещу дифтерия, тетанус и коклюш при деца до 2-годишна възраст

Първата реимунизация срещу дифтерия, тетанус и коклюш (4-ти прием на ваксините, от 16-месечна възраст на децата) е изпълнена в 90,97%. Четвърти прием са получили 49 024 от подлежащите 53 891 деца. **(Таблица 4а).** Прилагана е четири- и петкомпонентна ваксина ДТКаПи и ДТКаПиХИБ.

Задължителна реимунизация (пети прием ваксина) срещу дифтерия, тетанус и коклюш при деца на 6-годишна възраст

Реимунизацията срещу дифтерия, тетанус и коклюш на децата от 6-годишна възраст е изпълнена в 84,99%. От подлежащите 59 047, са имунизирани 50 188 деца. Прилагана е ваксина ДТКаПи. (**Таблица 4а**). Имунизационният обхват е незадоволителен, в

сравнение с нивото на същия през предходните години (2024 г. – 92,8 %; 2023 г. – 88,2%; 2022 г. – 86,5%; 2021 г. – 84,9%; 2020 г. – 88,1%).

Задължителна реимунизация (шести прием ваксина Тдка) срещу дифтерия, тетанус и коклюш при деца на 12-годишна възраст

От подлежащи 60 857 деца, 49 107 са имунизирани. Имунизационният обхват за 2025 г. е 80,69% (**Таблица 4а**).

Таблица 4а. Реимунизации срещу дифтерия, тетанус и коклюш при деца до 12-годишна възраст през 2025 г.

Ваксина	**Комбинирани ваксини срещу дифтерия, тетанус и коклюш**			
Приеми	**Подлежщи**	**Имунизирани**	**%**	**Неимунизирани**
4 прием - реимунизация на 16 мес. Pentaxim	53 891	49 024	90,97	4 867
5 прием - реимунизация на 6 г. Tetraxim	59 047	50 188	84,99	8 859
6 прием - реимунизация на 12 г. Boostrix	60 857	49 107	80,69	11 750

Задължителна реимунизация срещу дифтерия и тетанус на 17-годишна възраст и на/над 25-годишна възраст (Таблица 4б)

На 17-годишна възраст за реимунизация с ваксина Тд са подлежали 66 949 младежи, а са имунизирани 49 304. Отчетеният имунизационен обхват (73,6%) за страната е по-нисък, в сравнение с предходните две години (2024 г. – 82%; 2023 г. – 80,4%).

През 2025 г. се наблюдава значителен спад в реимунизацията срещу тетанус и дифтерия във всички възрасти на/над 25 г. Реимунизациите са в диапазона 26,9 – 37,1%. От общо 595 766 подлежащи на реимунизации срещу дифтерия и тетанус лица от 17-годишна възраст до и над 85-годишна възраст, 216 986 са реимунизирани (имунизационен обхват – 36,42%).

Таблица 4б. Реимунизация срещу тетанус и дифтерия на възрастни през 2025 г.

Ваксина	**Комбинирани ваксини срещу, тетанус и дифтерия (Td)**		
Възраст	**Подлежащи**	**Имунизирани**	**%**
На 17 г.	66 949	49 304	73,6
На 25 г.	57 820	15 163	26,2
На 35 г	79 844	21 458	26,9
На 45 г.	91 651	27 517	30,0
На 55 г.	98 245	31 856	32,4
На 65 г.	90 426	32 020	35,4

На 75 г	82 172	30 502	37,1
На и над 85 г.	28 659	9 166	32,0
Общо	**595 766**	**216 986**	**36,42**

Имунизация срещу полиомиелит

През годината имунизацията срещу полиомиелит е извършвана с комбинирани ваксини, съдържащи инактивирана полиомиелитна ваксина.

Обхватът с три дози полиомиелитна ваксина е 91,68% (**Таблица 5**) и е по-нисък, в сравнение с предходните две години (**Таблица 6**).

Таблица 5. Имунизация срещу полиомиелит през 2025 г.

Прием на ваксината	Брой подлежащи на имунизация	Брой имунизирани	Имунизационен обхват (%)
I прием	50 356	48 777	96,86
II прием	50 356	46 531	92,40
III прием	50 356	46 166	91,68
IV прием (Реимунизация на16 мес.)	53 891	49 024	90,97
V прием (Реимунизация на 6 г.)	59 047	50 188	84,99

Таблица 6. Имунизационен обхват с три приема ваксина срещу полиомиелит през периода 2020-2025 г.

Година	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Обхват (%)	91,2	89,5	91,4	92,4	94,2	91,7

На **Таблица 7** е представен регистрирания обхват с I-ва (90,97%) и II-ра реимунизация (85,99%) срещу полиомиелит, които са по-ниски, спрямо предходната година.

Таблица 7. Реимунизация срещу полиомиелит през периода 2020-2025 г.

Години	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I реимунизация (16 месеца)						
Подлежащи	56 385	41 386	55 337	55 843	56 077	53 891
Обхват (%)	88,9	77,5	88,9	89,4	92,6	90,97
II реимунизация (6 години)						
Подлежащи	63 237	51 357	62 909	60 863	61 983	59 047
Обхват (%)	88,1	84,9	86,5	88,2	92,8	85,99

Имунизация срещу хепатит Б на деца до 1-годишна възраст

Имунизациите срещу хепатит Б през 2025 г. са извършени с две ваксини: моноваксина срещу хепатит Б и с комбинирана ваксина ДТКаХепБПиХИБ, с приеми според имунизационния календар на страната, актуализиран през 2025 г.

Първият прием от имунизацията срещу хепатит Б е извършван с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема. В **Таблица 8** са представени обобщени данни за 2025 г. за задължителните имунизации срещу хепатит Б в страната.

Таблица 8. Имунизация срещу хепатит Б в България през 2025 г.

Прием на ваксината	**Брой подлежащи на имунизация**	**Брой имунизирани**	**Имунизационен обхват (%)**
Прием в родилен дом (Моноваксина)	50 356	47 973	95,27
На 1-ви месец (Моноваксина-втори прием)		425	
На 6-ти месец (Моноваксина-трети прием)		439	
I прием (в състава на шествалентна ваксина)	50 356	47 454	94,24
II прием (в състава на шествалентна ваксина)	50 356	45 775	90,90
III прием (в състава на шествалентна ваксина)	50 356	44 517	88,40

Задължителната имунизация срещу хепатит Б със завършена имунизационна схема от три приема с двата вида ваксина (моноваксина и шесткомпонентна) е изпълнена при 44 956 от подлежащите 50 356 деца (89,28%). Имунизационният обхват е най-нисък за последните пет години (**Таблица 8а**).

Таблица 8а. Имунизация срещу хепатит Б (завършена имунизационна схема от три приема) в България през периода 2020-2025 г.

Година	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Имунизационен обхват (%)	91,5	89,4	91,5	92,3	94,2	89,3

Имунизация срещу морбили, паротит и рубеола

Имунизационният обхват за първи прием (МПР1) – 88,3%, е по-нисък, в сравнение с предходната година, и не достига изискванията за необходимото ваксинално покритие от ≥95%, което осигурява прекъсване разпространението на вируси на морбили и рубеола в обществото **(Таблица 9)**.

Таблица 9. Имунизация срещу морбили, епидемичен паротит и рубеола в България през 2025 г.

Триваксина МПР	Брой подлежащи	Брой обхванати	Имунизационен обхват (%)
МПР1 (на 13 месеца)	53 891	47 584	88,3
МПР2 (на 12 години)	60 857	49 939	82,1
МПР в други възрасти		256	

Нито една област не отчита необходимия целеви обхват от ≥95%. Имунизационен обхват с МПР1 над 90% отчитат само 3 оласти (Перник, Пловдив, Смолян). Във всички останали области имунизационният обхват е под тази стойност и създава риск от възникване на епидемичен взрив от всяка една от трите инфекции, и особено на морбилна инфекция, предвид високата контагиозност на морбилния вирус.
С втори прием ваксина морбили-паротит-рубеола (МПР2) имунизационният обхват от 82,06% е най-нисък от 2020 г. досега. Само две области (Плевен и Смолян) отчитат обхват с МПР2 между 91,1-91,3%, в останалите се отчита обхват по-нисък от 90%.
На Таблица 9а са представени данните за извършените имунизации с триваксина МПР в страната в периода 2020-2025 г. И при двата приема на триваксината е налице крайно незадоволително ниво на имунизационния обхват.

Таблица 9а. Имунизационен обхват (%) с ваксина МПР1 (13 месеца) и МПР2 (12 години) в България през 2020-2025 г.

Година	2020	2021	2022	2023	2024	2025
МПР1 (%)	88,3	88,7	91,2	91,6	94,2	88,3
МПР2 (%)	84,5	85,8	87,2	87,4	90,5	82,1

Имунизации и реимунизации с ваксина срещу морбили, приложени на лица в други възрасти

Отчетени са общо 256 дози ваксина, приложени на лица в други възрасти (**Таблица 9**).

Имунизация срещу пневмококова инфекция

В **Таблица 10.** е представен имунизационния обхват с пневмококова конюгирана ваксина през 2025 г. по приеми, а в **Таблица 10а** е представен обхвата при реимунизацията с тази ваксина в периода от 2020 г. до 2025 г.

Таблица 10. Имунизация и реимунизация срещу пневмококови инфекции с конюгирана ваксина в България през 2025 г.

Приеми	Подлежащи	Имунизирани	Имунизационен обхват (%)	Неимунизирани
1 прием	50 356	48 013	95,3	2 343
2 прием	50 356	45 795	90,9	2 561
3 прием	53 891	46 094	85,5	7 797

Имунизационният обхват при реимунизация се задържа на относително стабилно ниво 85-87% през целия период. Изключение се наблюдава само през 2024 г., когато обхватът е най-висок – 91%.

Таблица 10а. Реимунизация срещу пневмококови инфекции с конюгирана ваксина в България през периода 2020- 2025 г.

Година	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Имунизационен обхват (%)	85,5	86,4	87,7	87,4	91,0	85,5

Имунизация срещу Хемофилус инфлуенце тип б

Задължителната имунизация срещу Хемофилус инфлуенце тип б (ХИБ) през 2025 г. се извършва с многокомпонентни ваксини, съдържащи ваксина срещу ХИБ. Имунизационният обхват с три дози шесткомпонентна съдържаща ХИБ ваксина е 90,1%. С 3-ти прием са обхванати 45 354 от подлежащите на имунизация 50 356 деца (**Таблица 11**).

Таблица 11. Имунизация срещу инфекции причинявани от хемофилус инфлуенце тип б в България през 2025 г.

Приеми	Брой подлежащи	Брой имунизирани	Имунизационен обхват (%)
1 прием	50 356	48 203	95,7
2 прием	50 356	46 139	91,6
3 прием	50 356	45 354	90,1
4 прием	53 891	47 327	87,8

Отчита се намаление в имунизационния обхват с трети прием спрямо предходната година (**Таблица 11а**).

Таблица 11а. Имунизация срещу Хемофилус инфлуенце тип б в България през 2020-2025 г.

Година	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Имунизационен обхват (%)	91,4	89,5	91,6	92,4	94,2	90,1

ЦЕЛЕВИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2025 г.

Имунизация срещу бяс

Пост-експозиционна профилактика с ваксина срещу бяс е отчетена при 2 832 лица, наранени от животни. Имунизации са отчетени от всички области на страната. Отчетени са и 8 профилактични имунизации (23 – за 2024 г., 149 – за 2023 г.).

Имунизации срещу ККХТ

От РЗИ Кърджали, Сливен, Шумен, Ямбол и Бургас са отчетени 32 имунизации и 58 реимунизации.

Имунизации срещу коремен тиф

Не са отчетени имунизации.

В **Таблица 12** е представен броя на имунизираните и реимунизираните лица с целеви имунизации и реимунизации през 2025 г.

Таблица 12. Целеви имунизации и реимунизации срещу бяс, ККХТ и коремен тиф в България през 2025 г.

Имунизация/ реимунизация	Брой имунизирани	Брой реимунизирани
Срещу бяс	2 832	0
Срещу ККХТ	32	58
Срещу коремен тиф	0	0

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2025 г.

В **Таблица 13** са представени броя на имунизираните и броя на реимунизираните лица с препоръчителни ваксини през 2025 г.

Таблица 13. Имунизации и реимунизации с препоръчителни ваксини през 2025 г.

Имунизация срещу	Брой имунизирани	Брой реимунизирани
Жълта треска	2 010	0
Хепатит Б (с трети прием)	123	61
Хепатит А	167	96
Пневмококови инфекции	675	0
Менингококови инфекции	1 891	144
Морбили, паротит и рубеола	159	52
Варицела	10 062	0

Пост-експозиционна профилактика на тетанус при нараняване е проведена при 7083 лица.

Данните за проведена през годината **ваксинопрофилактика срещу сезонен грип**, обобщени от НЦОЗА (за имунизация на лица със сезонни противогрипни ваксини) са за 17 806 лица, които са имунизирани извън обхвата на Националната програма.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2025 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА, (2025-2030 г.)

С Решение на Министерския съвет, на 09.04.2025 г. е приета Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г., при изпълнението на която се осигурява безплатна ваксинация (ваксина и нейното прилагане) за момичета на възраст 10-14 г. и на момчета на възраст 10-13/14 г. Ваксината, която се осигурява по Програмата е срещу най-честите причинители на ракови заболявания и брадавици – типове – 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58. За изграждане на ефективна защита, всяко момиче, момче или жена от целевите групи на Програмата следва да получи необходимия брой приеми, като при деца до 14 г. включително се поставят две дози от ваксината с интервал между приемите от поне 6 месеца, а при по-големите лица (включени в Програмата от 2026 г.) – 3 дози от ваксината с интервал между първи и втория – 2 месеца и между втория и третия – поне 4 месеца.

През 2021 г. беше отчетен нисък имунизационен обхват. През 2022 г. се отчита имунизационен обхват от 9,1% с втори прием при 12-годишните момичета (с около 3 % по-висок спрямо 2021 г.), а през 2023 г. имунизационният обхват при 12-годишните е по-нисък – 6,2%. Имунизационният обхват през 2024 г. е изчислен върху броя на живородените момичета през 2012 и 2011 г. и съответно, е между 5% и 3% (изчисленията

са приблизителни, тъй като не са предоставени данни за действителния брой момичета на съответните възрасти, които би следвало да се приемат за подлежащи на ваксинация). През 2025 г. имунизационният обхват при момичетата във възрастова група 10-14 г. (151 012 подлежащи) отново е нисък (3,17%). В съответствие с Програмата, първи ваксинации са проведени и при момчетата (**Таблица 14**). Общият брой момчета на възраст 10-13 г. през 2025 г., които би могло да бъдат ваксинирани (т.е., да са подлежащи на ваксинация с ваксина срещу човешки папиломни вируси) е 127 899.

Таблица 14. Имунизация срещу човешки папиломен вирус в България през 2025 г. (момичета и момчета)

Ваксинална схема от два приема ваксина	**1-ви прием**		**2-ри прием**	
Възраст на имунизираните лица	**Имунизирани**	**Имун. обхват (%)**	**Имунизирани**	**Имун. обхват (%)**
10-14 години (момичета)	8 885	5,88	5 622	3,17
10-13 години (момчета)	3 962	3,09	26	0,02

https://plusmen.bg/

Според обобщенията на НЦОЗА, в страната са приложени и 1 251 имунизационни дози (първи и втори прием) ваксина срещу ЧПВ в други възрасти – на 10-годишни момичета и по-възрастни лица от женски пол. За сравнение, от отчетите на НЦОЗА, през 2023 г. са отразени приеми при 531 лица, през 2022 г. – при 265 лица, а през 2021 г. – при 876 лица.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022-2025.

Имунизацията срещу ротавирусни инфекции е препоръчителна и се прилага перорално по двудозова или тридозова схема при деца навършили 6-седмична възраст. През 2025 г. със завършена имунизация срещу ротавирусен гастроентерит са 30 446 деца (https://plusmen.bg/), или 60,46% от всички деца до 1-годишна възраст, които би могло да бъдат имунизирани по Програмата.

В периода 2018-2022 г. около 40% от новородените са имунизирани срещу ротавирусни инфекции.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА СРЕЩУ СЕЗОНЕН ГРИП И НА ПНЕВМОКОКОВИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИЦА НА И НАД 65 ГОДИНИ (2023-2026 г.)

От въвеждането на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката срещу сезонен грип при лица на и над 65 години през 2019 г. се наблюдава положителна тенденция с нарастващ имунизационен обхват срещу грип при възрастните хора над 65 години.

По Национална програма през 2025 г. са отчетени имунизации срещу грип на 380 116 лица (през 2024 г. – 297 927 лица; 2023 г. – 230 947 лица).

По програмата за ваксиниране на възрастни на и над 65-годишна възраст с ваксини срещу пневмококови инфекции, през 2025 г. са отчетени имунизации на 26 004 лица (2024 г. са отчетени имунизации на 40 845 лица).

ИЗВОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АНАЛИЗА НА ИМУНИЗАЦИИТЕ ПРЕЗ 2025 г.

През 2025 г. се отчита намаляване на имунизационния обхват при задължителните ваксинации спрямо показателите за предходната година и достигане на нивата, отчетени през 2020 г.

По отношение на целевите имунизации, въвеждането на безплатни реимунизации срещу коклюш и имунизации срещу RSV-инфекция при бременни жени е положителна мярка в посока защита на новороденото още по време на бременността и ограничаване на риска от тежко протичане през първите месеци след раждането. Евентуален обхват с двете имунизации ще може да бъде обсъден в анализа за следващата година.

Изпълнението на имунизационната програма за първична профилактика на рак на маточната шийка през 2025 г. е незадоволително. В изпълнението на имунизациите по останалите национални програми има подобрение при имунизациите с ротавирусни ваксини в кърмаческа възраст, както и при имунизациите на възрастни хора над 65-годишна възраст със сезонни противогрипни ваксини.