

Как да предпазим себе си и дома си от комари?



Комарите са двукрили насекоми, принадлежащи към семейство *Culicidae*.

Жизненият цикъл на комарите преминава през четири стадия – яйце, ларва, какавида и възрастен индивид (имаго), като първите три стадия се развиват във вода.

Комарите се развиват в различни по вид басейни със застояла вода, където женските снасят яйцата си.

Най-чести биотопи са плитки водоеми, блата, крайречни разливи, напоителни канали, шахти, декоративни езера, съдове задържащи дъждовна вода.

Целият цикъл от яйце до възрастен комар трае средно 7-14 дни, в зависимост от температурата на водата.

Мъжките комари се хранят с нектар, а женските освен с нектар, и с кръв от хора и животни, за да могат да се развият яйцата в тях.

В ролята си на временни кръвосмучещи паразити, комарите пренасят редица опасни заболявания като малария, треска Западен Нил, денга, чикунгуня, жълта треска и енцефалити.

Премахване на местата за размножаване на комари

- Покриване на съдове (кофи, бидони) за съхранение вода (чешмяна, дъждовна).
- Покриване или обръщане наобратно на строителни колички.
- Ежеседмична смяна на водата, която се съхранява в съдове без капаци, като градински лейки.
- Честа смяна на водата в поилки за домашни животни.
- Отстраняване на неизползвани кутии, бутилки, вази и други съдове, в които се задържа вода.
- Отстраняване на стари автомобилни гуми.
- Отстраняване на течове и отводняване на терена.
- Отстраняване на вода от хралупи на дървета в двора.
- Редовно почистване на улуци и отходни шахти.
- Редовна профилактика на декоративни езера и фонтани, почистване на подложки на саксии.
- Редовна профилактика на басейни и почистване на зоните около тях.



Защита от ухапвания

- Носене на дрехи с дълги ръкави и крачоли при престой на открито.
- Използване на мрежи против комари.
- Използване на репеленти.



Безопасна употреба на репеленти

- Прилагат се директно върху кожата и облеклото. Третират се откритите части на тялото (лице, врат, ръце, крака), които са изложени на ухапвания.
- При обработка на лицето и врата, продуктът първо се пръска върху ръката и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.
- Репелентът се нанася на равен, тънък слой, като се препоръчва да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.
- За деца обработката на кожата трябва да се извършва от възрастен.
- Репелентът не трябва да се нанася върху дланите и ръцете на малки деца, за да не попада в устата им.
- След прекратяване на контакта с насекоми, участъкът от кожата, върху който е нанесен продуктът, трябва да се измие обилно с вода и сапун.
- Репеленти с перметрин се използват само за нанасяне върху облекло.

Изготвили: специалисти при лаб. Медицинска арахноентомология и зоология с дезинсекция и дератизация, НЦЗПБ

Използване на биоциди

На закрито

Електрически изпарители с течност или таблетки: Уредът се включва в контакта в близост до отворен прозорец или врата на тераса.



Готови за употреба аерозоли: Затварят се вратите и прозорците. Пръска се в горната част на помещението. Помещението остава затворено за около 15-30 минути, след което се проветрява добре.



На открито около домовете

Инсектицидни спирали: Пали се единият край на спиралата и се оставя да тлее.



Инсектицидни лампи: Тези устройства привличат насекомите с ултравиолетова светлина и ги унищожават чрез електрическа мрежа или лепкава повърхност.



Биоциди, от които се приготвят работни разтвори: използват се пръскачки, с които се обработват външни стени, около врати и прозорци, стрехи и околната растителност (храсти, дървета). Не се пръска върху растения, предназначени за консумация.

